

PRIPREMA ZA KOLONOSKOPIJU

Pre same procedure pacijent dobija specifična uputstva koja se odnose na pripremu za endoskopiju. Važno je na vreme pročitati uputstva i strogo ih se pridržavati. Ako imate pitanja nemojte se ustručavati da pitate. Od Vas se može tražiti da prilagodite dozu lekova ili ili da neke od njih privremeno prestanete da uzimate (kao što su lekovi poput Aspirina...). Pre zakazivanja endoskopije treba da razgovarate sa lekarom o lekovima.

Sedam dana pre snimanja ne jesti hranu koja sadrži semenke (susam, grožde, musli, papriku, paradajz...) !!!

Dan pre zakazanog snimanja:

- Uzimati samo bistre supe (bez rezanaca), sok od jabuke, čajeve i vodu
- U 15h popiti jednu kesicu praška Picoprep rastvorenog u jednoj čaši vode (150 ml). Na svakih sat vremena piti 250 ml tečnosti dok traje efekat leka, tj. narednih 7 sati.
- U 8h ujutru popiti drugu kesicu praška Picoprep rastvorenog u jednoj čaši vode (150 ml). Na svakih sat vremena piti 250 ml tečnosti dok traje efekat leka, tj. narednih 7 sati.

POŽELJNO JE UZIMANJE JOŠ TEČNOSTI, RADI BOLJEG ČIŠĆENJA

- Na dan intervencije ne jesti ništa, dozvoljeno uzimanje samo tečnosti.
- Obavezno piti terapiju za srce i povišen pritisak u toku pripreme i na dan snimanja.
- Pet dana pre snimanja ne uzimati ankikoagulantnu terapiju (Aspirin, Cardiopirin i slično)
- Osobe sa visokim pritiskom treba češće da kontrolišu pritisak tokom pripreme a dijabetičari nivo šećera.
- Osobe koje boluju od dijabetesa na oralnoj hipoglikemijskoj terapiji na dan pripreme i na dan pregleda ne uzimaju terapiju